

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
HELLENIC SOCIETY FOR CHEMOTHERAPY

ΣΗΨΗ 2009

**ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
(ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)**

ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)**

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ**

Συντονιστές: Χ. Γώγος, Ε. Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης

www.sepsis.gr


ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ...

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

TARGOCID[®] IM

(teicoplanin)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ



- ▶ **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ**
έναντι των Gram θετικών
- ▶ **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ**
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
που επιτρέπει χορήγηση
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ IV ή IM
- ▶ **ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ** φαινομένων
ωτοτοξικότητας, νεφροτοξικότητας
Και αλλεργικών αντιδράσεων

... ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Το Targocid είναι ένα γλυκοπεπτιδικό αντιβιοτικό που λαμβάνεται από την ζύμωση του *Actinoplanes teichoamyliceticus*. Η δράση του είναι κατά κύριο λόγο βακτηριοκτόνος. Μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια και ενδομυϊκά. **ΕΝΔΕΞΕΙΣ** Μετρίως και βαρείς λοιμώξεις, από Gram - θετικούς παθογόνους οργανισμούς, της καρδιάς (π.χ ενδοκαρδίτιδα) των οστών και των αρθρώσεων (π.χ οστεομυελίτιδα) - των αναπνευστικών οδών - του δέρματος και των μαλακών μορίων - των νεφρών και εκφωρητικών ουροφόρων οδών - του γαστρεντερικού σωλήνα - Μικροβισμία, σήψηση **ΑΝΤΕΝΔΕΞΕΙΣ**: Το Targocid δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με ιστορικό υπερευαισθησίας στην δραστική ουσία. Η τεϊκοπλανίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Το Targocid δεν πρέπει να χορηγείται κατά την διάρκεια της κύησης και του θηλασμού εκτός και αν το πιθανό όφελός μιας τέτοιας θεραπείας αντισταθμίζει τους πιθανούς κινδύνους. Δεν είναι γνωστό αν η τεϊκοπλανίνη αποβάλλεται στο μητρικό γάλα. Ένση τεϊκοπλανίνης στον υπερακοιλιώδη χώρο, η οποία ήταν αντίθετη στις οδηγίες, προκάλεσε εγκεφαλικό σπασμό σε έναν ασθενή. **ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ** Το Targocid γενικά χορηγείται μια φορά το 24 ώρες. Σε περίπτωση βαρέων λοιμώξεων χορηγείται ακόμη μια δόση την πρώτη ημέρα ώστε να επιτευχθούν υψηλές συγκεντρώσεις στον ορό γρήγορα. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΕΡΕΙΕΣ**: Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε κλινικές μελέτες. Σε άτομα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό αναφέρθηκαν εξάνθημα, ερύθημα κνησμός ή πυρετός. Βρογχόσπασμος ή αναφυλακτικές αντιδράσεις. Εμφανίσθηκαν σε μεμονωμένα περιστατικά. Ης τοπική αντίδραση, πόνος μπορεί να εμφανισθεί περιστασιακά στο σημείο της ένεσης. Φλεβίτιδα ή σχηματισμός αποστήματος έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια. Σε μερικές περιπτώσεις μια παροδική αύξηση στις τρανσαμινάσες, ημυονοφιλία και /ή της αλκαλικής φωσφοτάσης έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Targocid. Αύξηση της κρεατινίνης του ορού έχει αναφερθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ημυονοφιλία, θρομβοκυτοπενία ή λευκοπενία έχουν περιγραφεί σε σπάνιες περιπτώσεις. Από το γαστρεντερικό ναυτία και έμετος σπάνια. Κεφαλαλγία ή ζάλη σπάνια μπορεί να παρατηρηθούν. Σε εξοτιμωκείμενες περιπτώσεις μικρή απώλεια της ακοής, ίλιγγος ή διαταραχή του λαβυρίνθου έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς σε αγωγή με τεϊκοπλανίνη σε συνδυασμό με ένα δυναμικό ωτοτοξικό φάρμακο όπως μια αμινογλυκοσίδη. **ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**: Όταν αφορά την υπερδοσολογία, υπάρχουν στοιχεία για δύο παιδιά με ακοκκιοκυτταραιμία, που τους χορηγήθηκαν αρκετές δόσεις 100 mg/kg ημέρα Targocid στο καθένα κατά λάθος. Παρά της υψηλής συγκεντρώσεως στον ορό (300 mg) δεν εμφανίσθηκαν φαινόμενα δηλητηρίασης. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα άλλα περιστατικά δηλητηρίασης με Targocid. Συνιστώνται γενικά συμπτωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση μιας υπερδοσολογίας. Το Targocid δεν απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση ή την περιτοναϊκή κάθαρση. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**: 1 φιαλίδιο περιέχει 200 mg ή 400 mg λυοφιλιζισίου σκόνης - I φύσιγγα περιέχουσα 3ml αποστειρωμένου υδάτος. **Πρόιον της MERRELL DOW PHARMACEUTICALS INC. USA**
Παρασκευαστής / Συσκευαστής: **GRUPPO LEPETIT SPA - Ιταλία**
Α.Τ.: Targocid 200 mg 31,15€ - Targocid 400 mg 71,61€
Ν.Τ.: Targocid 200 mg 18,42€ - Targocid 400 mg 42,34€
Περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες στις πλήρεις οδηγίες



BIANEX A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Γραφείο Επιστημονικής Ενήμερωσης
ΑΘΗΝΑ: Οδός Τετάρτου 146 71 Ν. Ερυθρού, Τηλ.: 210 8009111
E-Mail: mailbox@bianex.gr • INTERNET: http://www.bianex.gr
ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Β.Χασιού 2, Τηλ: 2310 840440

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης λειτουργεί από το Μάιο του 2006 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας με τη συμμετοχή Παθολογικών Κλινικών, Χειρουργικών Κλινικών και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας από όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ομάδας μας, το σηπτικό σύνδρομο εμφανίζεται στη χώρα μας υψηλή συχνότητα και θνητότητα, ποσοστά τα οποία είναι ανάλογα με των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η ανάγκη εκπαίδευσης όλων μας για την σωστή αντιμετώπιση των ασθενών, οδήγησε στη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Ευχόμαστε η Ημερίδα να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στον εκπαιδευτικό της σκοπό,

Οι συντονιστές

Χ. Γώγος

Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

09:30 - 10:00 Βραχεία Τελετή Έναρξης

Προεδρείο

Χ. Γώγος, Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

Προσφωνήσεις

Ε. Γιαμαρέλλου

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Χ. Ρούσσος

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας

ΙΑτρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε. Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης

*Ιστορική Αναδρομή της Ελληνικής Ομάδας
Μελέτης της Σήψης*

10:00 - 11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ»

Προεδρείο

Ν. Μαγκίνα, Μ. Λαζανάς

The significance of procalcitonin for the
early diagnosis and management of the seriously
ill patient

Michael Meissner

Τα δεδομένα της Ελληνικής Ομάδας

Μελέτης της Σήψης

Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης

Συζήτηση

11:00 - 11:20

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11:30 - 12:10

ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο

Ε. Γιαμαρέλλου

The inflammasome in infection and critical illness

Jos WM van der Meer

12:15 - 13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ»

Προεδρείο

A. Αρμαγανίδης, Χ. Μπασιάρης, Π. Γαργαλιάνος -
Κακολύρης

The role of genetic predisposition for the
pathogenesis of sepsis

Bart Ferwerda

Pathophysiology of severe fungal infections

Mihai G. Netea

Νεώτερα αντιμυκητιασικά φάρμακα

Γεώργιος Δημόπουλος

Έχει θέση η δαπτομυκίνη στον βαρέως
πάσχοντα;

Κυριακή Κανελλακοπούλου

Συζήτηση

14:00 - 14:45 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

14:50 - 15:20 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο

E. I. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης

Coagulation pathways: a novel target of
immunointervention

Pierre-François Laterre

15:30 - 16:15 **ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ**
«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ»

Προεδρείο

Χ. Γώγος, Α. Παπαπετρόπουλος, Α. Καραΐσκου

Καταγραφή στάσης νοσηλευτών στο
σηπτικό σύνδρομο
Πετρούλα Σταματάκη - Σωτηροπούλου

Συζήτηση αποτελεσμάτων για
Προκαλσιτονίνη / NK κύτταρα
Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης

Συμμετέχοντες συγγραφείς
Άλλες προοπτικές
Συζήτηση με το ακροατήριο

16:00 - 16:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕ**

16:35 - 18:00 **ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ (INTERACTIVE) ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ**
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ»

Προεδρείο

Ε. Γιαμαρέλλου, Χ. Γώγος

Συμμετέχοντες

Α. Αρμαγανίδης, Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-
Μπουρμπούλης, Γ. Λ. Δαΐκος, Ι. Δημοπούλου,
Ε. Δουζίνας, Γ. Ζωγράφος,
Κ. Κανελλακοπούλου, Φ. Κλούβα - Μολυβδά,
Ν. Μαγκίνα, Σ. Ορφανός, Η. Τσαγκάρης

Δορυφορική Εκδήλωση της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ

18:00 **ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ,**
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (6 CME credits)

ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

(με αλφαβητική σειρά)

- Bart Ferwerda, Department of Internal Medicine, Center for Infectious Diseases, University Medical Center St. Radboud, Nijmegen, The Netherlands
- Pierre-François Laterre, Professor of Medicine, Department of Critical Care Medicine, St-Luc University Hospital, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium
- Jos WM van der Meer, Professor of Internal Medicine, Head Department of Medicine and Center for Infectious Diseases, University Medical Center St.Radboud, Nijmegen, The Netherlands
- Michael Meissner, Professor of Critical Care, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Hospital Dresden Neustadt, Dresden, Germany
- Mihai G. Netea, Professor of Experimental Internal Medicine, Department of Internal Medicine, Center for Infectious Diseases, University Medical Center St. Radboud, Nijmegen, The Netherlands

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ

(με αλφαβητική σειρά)

- **Απόστολος Αρμαγανίδης**
Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Παναγιώτης Γαργαλιάνος - Κακολύρης**
Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων, Περιφερικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
- **Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης**
Επίκουρος Καθηγητής, Δ΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Ελένη Γιαμαρέλλου**
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Δ΄ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Χαράλαμπος Γώγος**
Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
- **Γεώργιος Λ. Δαΐκος**
Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Γεώργιος Δημόπουλος**
Λέκτορας Εντατικής Θεραπείας, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Ιωάννα Δημοπούλου**
Επίκουρη Καθηγήτρια, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Εμμανουήλ Δουζίνας**
Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Γ΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Γεώργιος Ζωγράφος**
Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

- **Κυριακή Κανελλακοπούλου**
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δ΄ Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Αγγελική Καραΐσκου**
Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
- **Φυλλίς Κλούβα - Μολυβδά**
Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας,
Νοσοκομείο «Θριάσιο»
- **Μάριος Λαζανάς**
Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος
και Μονάδας Λοιμώξεων, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
- **Νίνα Μαγκίνα**
Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας,
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
- **Χαράλαμπος Μπασιάρης**
Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Πατρών
- **Ανδρέας Παπαετρόπουλος**
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μοριακής
Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Σχολής
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών
- **Στυλιανός Ορφανός**
Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Κλινική Εντατικής
Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
- **Πετρούλα Σταματάκη - Σωτηροπούλου**
Υποπλοίαρχος (ΥΝ),
Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
- **Ηρακλής Τσαγκάρης**
Λέκτορας Εντατικής Θεραπείας, Β΄ Κλινική Εντατικής
Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Divani Caravel (Αίθουσα Μακεδονία)
Βασ. Αλεξάνδρου 2 - 161 21 Αθήνα
Τηλ. 210 7207000 Φαξ, 210 7253750

Γραμματεία Ημερίδας:

Imagine Congress and Travel
Κολοκοτρώνη 9 -105 62 Αθήνα
Τηλ. 210 3252520 Φαξ, 210 3252530

Εγγραφή:

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Επίσημη Γλώσσα του συνεδρίου:

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Οι διαλέξεις των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Διπλώματα Παρακολούθησης:

Μετά τη λήξη της ημερίδας θα δοθούν διπλώματα παρακολούθησης από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME):

Στους συμμετέχοντες στην Ημερίδα θα δοθούν 6 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης(CME).

Ιστοσελίδα Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης

www.sepsis.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης και οι συντονιστές της Ημερίδας θα ήθελαν να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες τους στις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες κατά αλφαβητική σειρά για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της 1ης Ημερίδας «Σήψη 2009»

- ABBOTT LABORATORIES HELLAS A.E.B.E.
- BAYER HELLAS
- BIANEΞ A.E.
- BRAHMS GmbH
- CSL BEHRING
- JANSSEN CILAG A.E.B.E.
- NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
- SANOFI-AVENTIS
- SMART INTERMED
- ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
- PHARMALINE
- PFIZER HELLAS A.E.
- WYETH ΕΛΛΑΣ A.E.B.E



CUBICIN[®]

daptomycin



Novartis (Hellas) A.E.B.E.
T.Θ.52001,
144 10 Μεταμόρφωση,
Τηλ.: 210 28 11 712
www.novartis.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Βασ. Όλγας 216,
551 33 Καλαμαριά,
Τηλ.: 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 2828812

JAN/2007/CUB/AD/1

DORIBAX®

ενέσιμη δοριπενέμη

«Η πλήρης περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος διατίθεται από την Janssen-Cilag»



JANSSEN-CILAG
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.



- Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη Αθήνα, Τηλ: 210 6140061
- 12,5 χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, 570 01, Κόμβος Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 470800

INFECTINA

Ciprofloxacin 400mg/200ml

Καλύπτουμε...
τις απαιτήσεις σας

Infectina

Ασφάλεια
&
Αποτελεσματικότητα

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

INF02-09



Θ. Πεταλά 41, 14343 Ν. Χαλκηδόνα, Τηλ.: 210-2502023, Fax.: 210-2502010, E-mail: info@pharma-line.gr

ANEMIFER

Iron Sucrose

Μεγαλύτερη
Ασφάλεια

Υψηλή
Αποτελεσματικότητα

ΕΛΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών



TAVANIC[®]

levofloxacin **IV/oral**



PRODEL/08/09/01

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο επιστημονικό τμήμα της sanofi-aventis.

sanofi-aventis AEBE
Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, 176 74 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129
www.sanofi-aventis.gr



sanofi aventis

Προτεραιότητα στην υγεία.

Tygacil[®] *tigecycline*



TYG.08.JUL.001

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TYGACIL επικοινωνήστε με την εταιρία Wyeth Hellas SA.

Wyeth

Wyeth Hellas AEBE Κύπρου 126 & 25ης Μαρτίου, 164 52 Αργυρούπολη • Τηλ.: 210 99 81 600 • Fax: 210 99 21 994
Wyeth Hellas - CYPRUS BRANCH Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία - Κύπρος • Τηλ.: 00357 22 817690 • Fax: 00357 22 751855
<http://www.wyeth.gr>